

SCHWANGERSCHAFTSDIABETES INFORMATIONSBROSCHÜRE

SCHWANGER- SCHAFTS DIABETES



hopitauxschuman.lu

facebook.com/hopitauxrobertschuman

HERZLICH WILLKOMMEN, UNSERE DIABETESKLINIK STELLT SICH VOR!

02

03

Liebe Patientin,

Unser Ziel ist es Ihnen während Ihrer Schwangerschaft die bestmögliche Unterstützung und Betreuung anzubieten. Zu diesem Zweck haben wir diese Informationsbroschüre für Sie zusammengestellt.

Hier finden Sie allgemeine Informationen zum Thema Schwangerschaftsdiabetes, wie Ernährungstipps, Ratschläge zur Anpassung Ihres Lebensstils, eine Anleitung zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels, einige praktische Informationen, sowie Ihr persönliches Diabetikertagebuch.

Unsere Diabetesklinik besteht aus einem Team von Krankenschwestern, Ernährungsberaterinnen und Ärzten, die mit ihrer Spezialisierung im Fachbereich der Diabetologie, ihre Betreuung gewährleistet. Unsere Arbeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Abteilungen für Gynäkologie, Gefäßchirurgie, Kardiologie, Augenheilkunde, Nephrologie, Podologie, dem Sozialdienst und der Abteilung für Psychologie.

Wir freuen uns darauf, Sie in Ihrer Schwangerschaft begleiten zu dürfen.

Ihr Team der
Diabetesklinik

UNSERE AUFGABE

- Wir bieten Informationen und Schulungen zur Diabeteserkrankung: bezüglich der Symptome und Behandlungsmöglichkeiten, wir geben Empfehlungen zur Ernährung, Anleitungen zur Injektion von Insulin, zur Überwachung der Therapie und zur Durchführung notwendiger Untersuchungen.
- Wir gewährleisten eine umfassende medizinischen Betreuung unserer Diabetespatienten.
- Wir führen Schulungen unserer Patienten durch zum Umgang mit ihrer Erkrankung, zur Selbstbehandlung, sowie zur Vermeidung von möglichen Komplikationen.
- Wir sorgen für die Bereitstellung des erforderlichen technischen Equipments zur Diabetesbehandlung und weisen unsere Patienten in die Handhabung ein.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN UND ANGEBOTE

- Sie können über eine telefonische Hotline oder eine E-Mail-Adresse in Notfallsituationen mit uns Kontakt aufnehmen.
- Wir beraten und betreuen Diabetespatienten sowohl ambulant, als auch während ihrer stationären Behandlung in den Hôpitaux Robert Schuman.
- Wir bieten Informations- und Schulungsangebote speziell für schwangere Frauen mit Diabetes oder Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes an.
- Wir bieten spezifische Schulungen für Patienten mit Insulinpumpe an.
- Wir schulen Patienten und Angehörige bei neu diagnostiziertem Diabetes mellitus.
- Wir erstellen und analysieren individuell mit unseren Patienten Ihr Blutzuckerprofil.
- Wir bieten eine individuelle Ernährungsberatung durch Spezialisten.

PRÄVENTION

Die Diabetesklinik engagiert sich in der Diabetesprävention, sie bietet regelmässig Informations- und Schulungsveranstaltungen für das breite Publikum an.

WAS IST SCHWANGERSCHAFTSDIABETES?

04

05

Als Schwangerschaftsdiabetes wird eine Zuckerintoleranz bezeichnet, die während der Schwangerschaft auftritt, und in den meisten Fällen nach der Schwangerschaft wieder abklingt. Das Erkennen und Behandeln einer diabetischen Stoffwechsellage der Mutter in der Schwangerschaft kann Komplikationen bei Mutter und Kind vermeiden.

Der mütterliche Blutzucker (Glucose) gelangt über die Plazenta in den Kreislauf des Babys. Ein zu hoher Blutzuckerwert bei der Mutter führt daher ebenfalls zu einem erhöhten Blutzuckerwert beim Kind. Folgen können Übergewicht (Makrosomie), Fehlbildungen und eine Unterzuckerung beim Neugeborenen sein. Im späteren Lebensverlauf des Kindes erhöht sich das Risiko für Übergewicht und Diabetes mellitus. Durch tägliche Kontrollen des Blutzuckerspiegels und Senkung erhöhter Blutzuckerwerte bei der Mutter können diese Risiken gemindert werden. Auch für die Mutter bestehen Risiken: ein erhöhtes Infektionsrisiko, (Prä-)Eklampsie, Fehlgeburt, schwierige Geburt und erhöhtes Risiko eines Kaiserschnitts. In seltenen Fällen bleibt der Diabetes mellitus bei der Mutter auch nach der Schwangerschaft weiter bestehen.

Ein erhöhtes Risiko für Schwangerschaftsdiabetes besteht bei Frauen mit Übergewicht, familiärer Diabetesanamnese, spezieller ethnischer Abstammung, häufigen Schwangerschaften und Mehrlingsschwangerschaften, hohen Blutzuckerwerten vor der Schwangerschaft oder Schwangerschaftsdiabetes bei vorangegangenen Schwangerschaften. Prinzipiell kann jedoch jede werdende Mutter von Schwangerschaftsdiabetes betroffen sein, die Häufigkeit dieser Erkrankung ist in den letzten Jahren angestiegen.

Aufgrund der geringen Ausprägung von Symptomen wird der Schwangerschaftsdiabetes ohne Vorsorgeuntersuchung selten erkannt. Wir empfehlen jeder schwangeren Patientin, einen Test zur Diabetes- Früherkennung zwischen der 24. und der 28. Schwangerschaftswoche durchzuführen zu lassen. Der Zuckertoleranztest dient der Früherkennung: Nachdem die Schwangere ein Getränk mit 75 Gramm Zucker auf nüchternen Magen zu sich genommen hat, wird der Blutzuckerspiegel ein erstes Mal nach Ablauf einer Stunde und ein weiteres Mal nach 2 Stunden gemessen. Wenn ein oder mehrere erhöhte Werte festgestellt werden, besteht ein erhöhtes Diabetes-Risiko für die Patientin. In diesem Fall bedarf es zusätzlicher Blutuntersuchungen, einer genauen Überwachung des Blutzuckerspiegels, vor und nach dem Essen und regelmäßiger Konsultationen der Diabetesklinik und/oder eines Arztes.

Bei der Behandlung von Schwangerschaftsdiabetes spielen die Ernährung, insbesondere die Aufnahme von Kohlenhydraten, die Anpassung des Lebensstils, insbesondere regelmässige Bewegung, eine grundlegende Rolle. In manchen Fällen muss die Therapie durch orale Antidiabetika oder Insulin ergänzt werden.

Falls bei Ihnen Schwangerschaftsdiabetes festgestellt werden sollte, wird unser multidisziplinäres Team bestehend aus Fachärzten, Pflegepersonal und Ernährungsberaterinnen, Ihnen eine optimale Betreuung anbieten.

Sie erhalten von uns alle notwendigen Informationen über ihre Erkrankung, über die eventuellen Folgen und die Behandlungsmöglichkeiten. Unser Team zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Blutzuckerspiegel selbstständig vor und nach dem Essen messen können. Wir geben Ihnen Ratschläge zur Anpassung Ihres Lebensstils und zur Ernährungsumstellung während der Schwangerschaft. In der Regel reichen diese einfachen Maßnahmen aus, um Ihre Blutzuckerwerte ausreichend zu senken.

Sollten Ihre Blutzuckerwerte trotz angemessener Ernährung und gesunder Lebensweise weiterhin erhöht bleiben, wird Ihr behandelnder Arzt Ihnen eine medikamentöse Behandlung empfehlen. Wird eine Behandlung mit Insulin erforderlich, erhalten Sie eine ausführliche Schulung.

BETREUUNG UNSERER PATIENTINNEN

WIE WERDEN DIE BLUTZUCKERWERTE KONTROLLIERT?

06

In der ersten Sprechstunde wird eine Krankenschwester der Diabetesklinik Ihnen ein Gerät zur Verfügung stellen, mit dem Sie Ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren können.

07

Wann müssen Sie Ihren Blutzuckerspiegel messen?

Ihren Blutzuckerspiegel sollten Sie mindestens 6 Mal am Tag messen, da sich dieser im Verlauf des Tages verändert.

Ideale Messzeiten:

- 1. Messung nach dem Aufstehen, nüchtern
- 2. Messung 2 Stunden nach Beginn des Frühstücks
- 3. Messung vor dem Mittagessen
- 4. Messung 2 Stunden nach Beginn des Mittagessens
- 5. Messung vor dem Abendessen
- 6. Messung 2 Stunden nach Beginn des Abendessens



Empfohlene Blutzuckerwerte:

- während der Schwangerschaft: nüchtern: < 95 mg/dl
- vor jeder Mahlzeit: < 120 mg/dl
- 2 Stunden nach Beginn einer Mahlzeit: < 120 mg/dl

Vorgehensweise bei der Messung des Blutzuckerspiegels:

1. Vor jeder Messung sollten Sie sich die Hände mit Wasser und Seife waschen und gut abtrocknen.
2. Benutzen Sie vor der Messung keinen Alkohol zum Desinfizieren der Hände, da dieser das Ergebnis verfälschen kann.
3. Verwenden Sie für jede Messung eine neue Lanzette und einen neuen Teststreifen.
4. Stellen Sie die Einstechtiefe der Lanzette an der Stechhilfe ein.
5. Führen Sie den Teststreifen in das Messgerät ein.
6. Vermeiden Sie Einstiche an Daumen und Zeigefinger. Auch sollte Sie nicht in die Fingerkuppe stechen, um Sensibilitätsverlust und Schmerzen bei der Durchführung der Messung zu vermeiden. Stechen Sie seitlich in das Fingerendglied.
7. Tragen Sie den Blutstropfen auf den Teststreifen auf.
8. Tragen Sie das Ergebnis in ihr Tagebuch ein. Bei erhöhten Werten notieren Sie bitte eventuelle Begleitumstände (Stress, Krankheit, Fieber, unausgewogenes Essen).
9. Entsorgen Sie die Lanzette in einer speziell dafür vorgesehenen Tüte, die Sie kostenlos in Ihrer Apotheke erhalten.

(Es ist untersagt, die Lanzette im Hausmüll zu entsorgen.)

Injektionstechnik von Insulin

- Waschen Sie Ihre Hände.
- Schrauben Sie die Nadel auf den Insulinpen.
- Prüfen Sie die Durchgängigkeit der Nadel, indem Sie 2 Einheiten einstellen und in die Luft spritzen. Wiederholen Sie dies so oft, bis ein Tropfen Insulin erscheint.
- Geben Sie auf dem Pen die zu spritzen Einheiten ein.
- Wählen Sie den Einstichbereich, achten Sie auf eine intakte Haut und wechseln Sie jedes Mal die Einstichstelle.
- Für Nadeln, die kürzer als 6 mm sind, ist eine Hautfalte nicht notwendig.
- Stechen Sie vertikal (90°) in die Haut ein.
- Injizieren Sie langsam, ohne die Nadel zu bewegen.
- Warten Sie nach der Injektion 10 Sekunden ab, bevor Sie die Nadel aus der Haut entfernen.
- Entsorgen Sie die Nadel im gelben Container.





ERNÄHRUNGSBERATUNG: EMPFEHLUNGEN UND RATSSCHLÄGE

Die Ernährungspyramide



EINLEITUNG

Auf was sollten Sie bei der Ernährung nach einem positiven Zuckertoleranztest (zusätzlich zur regelmäßigen Messung des Blutzuckerspiegels) achten? Im folgenden Abschnitt geben wir Ihnen einige wichtige Ernährungsempfehlungen. Die Empfehlungen zur Vermeidung von Toxoplasmose und Listeriose während der Schwangerschaft, auf welche hier nicht ausdrücklich erneut eingegangen wird, sind zusätzlich zu befolgen.

NÄHRSTOFFE UND ERNÄHRUNG

Durch eine ausgewogene Ernährung mit einer angemessenen Zufuhr an Kohlenhydraten kann der Blutzuckerspiegel stabilisiert werden.

Der Tagesablauf sollte so durchgeplant sein, dass keine zu langen Pausen zwischen den verschiedenen Mahlzeiten liegen (zum Beispiel: 3 Mahlzeiten + ggf. eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag).

Die verschiedenen Lebensmittel versorgen den Körper mit den notwendigen Substanzen: Den Nährstoffen. Dabei handelt es sich um **Wasser, Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette, Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine**.

1. Nährstoffe, die den Blutzuckerspiegel nicht erhöhen

1.1. WASSER:

Der menschliche Körper besteht größtenteils aus Wasser. Wasser spielt eine grundlegende Rolle für den menschlichen Organismus: Ausscheidung der Rückstände des Körperstoffwechsels (Schweiß, Urin), Regulierung der Körpertemperatur und Transport von Substanzen im Körper. Der empfohlene Tagesbedarf an Wasser beträgt zwischen 1,5 und 2 Litern.

Wasserhaltige Lebensmittel: Mineralwasser, Tee, Kräutertee, Kaffee, Suppen, usw.

1.2. EIWEIßE:

Proteine sind vergleichbar mit den Ziegelsteinen eines Hauses, denn sie sind die Grundlage für das Wachstum und den Aufbau des Körpers. Dabei können sie tierischen Ursprungs (Fleisch, Fisch, Eier, usw.) oder pflanzlichen Ursprungs sein (Hülsenfrüchte, Soja und verwandte Produkte).

EIWEIßE TIERISCHEN URSPRUNGS:	EIWEIßE PFLANZLICHEN URSPRUNGS*:
EIER	GETREIDE + MILCHPRODUKTE
FLEISCH UND VERWANDTE PRODUKTE	GETREIDE + HÜLSENFRÜCHTE*
FISCH, MEERESPRODUKTE UND VERWANDTE PRODUKTE	KÖRNER + HÜLSENFRÜCHTE*
MILCH, KÄSE UND VERWANDTE PRODUKTE	<small>*sich ergänzend</small>

1.3. FETTE:

Fette sind eine wichtige Energiequelle, wobei fetthaltige Lebensmittel einen hohen Kaloriengehalt haben. Darüber hinaus enthalten sie fettlösliche Vitamine (Vitamine A, D, E, K). Diese sind wesentlich für das Sehen, den Knochenaufbau, die Stärkung des Immunsystems und die Blutgerinnung.

Genau wie bei den Eiweißen gibt es ebenfalls pflanzliche und tierische Fette.

Im Rahmen einer ausgewogenen und gesunden Ernährung sind pflanzliche Fette zu bevorzugen (Öle). So wird die optimale Zufuhr an mehrfach ungesättigten Fettsäuren und essentiellen Fettsäuren (Omega 3 und Omega 6) gewährleistet. Diese sind grundlegend für das Nervensystem, das Gehirn und die Stärkung des Immunsystems.

Fetthaltige Lebensmittel:

Öle, Margarine, Nüsse (Walnüsse, Haselnüsse, Cashewnüsse, Mandeln, Pistazien, usw.), Butter.

1.4. NÄHRSTOFFE ZUR STÄRKUNG DER ABWEHRKRÄFTE: MINERALSTOFFE UND VITAMINE

Auch in geringen Mengen sind Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine wesentlich für die verschiedenen Körperfunktionen im Organismus (Knochen, Nervensystem, Bildung der roten Blutkörperchen, Stärkung des Immunsystems, usw.).

Hierbei handelt es sich nicht um eine Energiequelle. Im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung wird die empfohlene Dosis an Mineralstoffen und Vitaminen in der Regel aufgenommen.

Wasser, Proteine, Fette, Vitamine und Mineralstoffe haben keinen direkten Einfluss auf den Blutzuckerspiegel.

Die im Folgenden aufgeführten Nährstoffe wirken sich direkt auf den Blutzuckerspiegel aus.

2. Nährstoffe, die den Blutzuckerspiegel erhöhen

2.1. DIE KOHLENHYDRATE:

Als Kohlenhydrate werden die in den Lebensmitteln enthaltenen Zuckerarten bezeichnet. Sie haben einen direkten Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und bilden die Hauptenergiequelle für den menschlichen Körper.

Kohlenhydrate sind lebensnotwendig; **denn ohne sie könnten wir uns weder bewegen, noch laufen oder denken. Daher ist es wichtig, bei den Kohlenhydraten eine gute Wahl zu treffen.**

Die Kohlenhydrate können in zwei wesentliche Unterkategorien unterteilt werden:

EINFACHE KOHLENHYDRATE

Zu erkennen sind diese oft an ihrem süßlichen Geschmack, wie zum Beispiel:

Glucose	Sirup
Saccharose	Weißer oder brauner Zucker
Fructose	In Früchten oder in Diabetikerprodukten
Lactose	In Milchprodukten: geringer Einfluss auf den Blutzuckerspiegel

KOMPLEXE KOHLENHYDRATE

geschmacksneutral, wie zum Beispiel:

Stärke	In Getreide, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchten
Inulin	Gehört zu den Ballaststoffen

Was passiert bei der Verdauung?

Die Verdauung wird im Folgenden schematisch dargestellt:

- Desto höher der Anteil an einfachen Kohlenhydraten in der Nahrung, umso schneller wird die Nahrung verdaut, wodurch der Blutzuckerspiegel schneller ansteigt. **Daraus folgt:** mit Saccharose und Glucose steigt der Blutzuckerspiegel schnell an.
- Desto höher der Anteil an komplexen Kohlenhydraten in der Nahrung, umso langsamer wird die Nahrung verdaut, wodurch der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt. Daraus folgt: mit Stärke steigt der Blutzuckerspiegel langsamer an.



Andere Faktoren, die zu einer schnelleren oder langsameren Verdauung beitragen:

- Vielfältigkeit bei den Mahlzeiten:** Je vielfältiger eine Mahlzeit (Proteine, Fette, Kohlenhydrate und Ballaststoffe), umso langsamer die Verdauung.
Beispiel: Eine Portion Nudeln im Vergleich zu einer vollständigen Mahlzeit mit Fleisch, Gemüse und Getreide.
- Die Verarbeitung eines Lebensmittels:** Desto stärker der Zustand eines Lebensmittels verändert wurde (gekocht, als Püree, als Saft), umso schneller wird es verdaut. Rohe Nahrungsmittel werden langsamer verdaut.
Beispiel: Orangensaft im Vergleich zu einer frischen Orange.
- Gehalt an Ballaststoffen:** Je mehr Ballaststoffe ein Lebensmittel enthält, umso langsamer wird es verdaut.
Beispiel: Vollkornbrot im Vergleich zu Weißbrot.

KOHLENDYDRATHALTIGE LEBENSMITTEL:

Getreide enthalten komplexe Kohlenhydrate und sorgen für einen langsamen Anstieg der Blutzuckerwerte:

- Getreide: Weizen, Hafer, Reis, Mais, Roggen, Gerste, Quinoa
- Mehl und Produkte, die daraus hergestellt werden: Brot, Nudeln, Kekse, Pizzateig, usw.
- Getreideerzeugnisse: Grieß, Couscous, Haferflocken, Cornflakes, Reisflocken, usw.
- Kartoffeln
- Hülsenfrüchte (=Trockengemüse): Trockenbohnen, Linsen, getrocknete Erbsen, Kichererbsen, weiße oder rote Bohnen, usw.

Früchte haben einen mittelstarken Einfluss auf den Anstieg der Blutzuckerwerte:

- Diese Früchte können roh oder gekocht verzehrt werden (als Kompott oder Obstsalat aus der Dose).

Haben einen starken Einfluss auf den Anstieg der Blutzuckerwerte:

- Bonbons
- Limonade
- Süßigkeiten
- Säfte

ACHTUNG: Der Einfluss auf den Blutzuckerspiegel hängt von der Verarbeitung des jeweiligen Lebensmittels ab (roh, gekocht, als Saft). Regel: Je mehr ein kohlenhydrathaltiges Lebensmittel gekocht wird, desto schneller steigt beim Verzehr der Blutzuckerspiegel an.

LEBENSMITTEL	WIRKUNG AUF DEN BLUTZUCKERSPIEGEL
Frischer Apfel	mittelstarke Wirkung
Apfelkompott ohne Zusatzzucker	mittelstarke bis starke Wirkung
Apfelsaft ohne Zusatzzucker	starke Wirkung

ANMERKUNGEN:

Gemüse:

Gemüse enthält im Vergleich zu den vorher beschriebenen Lebensmitteln nur einen geringen Anteil an Kohlenhydraten und hat daher nur einen schwachen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Zu empfehlen ist sowohl gekochtes Gemüse (als Fleischbeilage, Suppe, Gemüseauflauf, usw.), als auch rohes Gemüse (Salat, Rohkost) oder als Saft.

Milch und Milchprodukte:

Lactose hat nur einen geringen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Der Verzehr von **Natur-milchprodukten** muss daher nicht beschränkt werden.

Schwangerschaftsdiabetes Informationsbroschüre

Obwohl Ballaststoffe nur eine geringe Energiequelle (2 Kcal) darstellen, sollten sie nicht in einer gesunden und ausgewogenen Ernährung fehlen. Ballaststoffe haben einen positiven Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Sie regen die Darmtätigkeit an, fördern das Sättigungsgefühl, verlangsamen die Verdauung und verlangsamen dadurch den Anstieg des Blutzuckerspiegels.

Ballaststoffreiche Lebensmittel:

- Vollkornbrot
- Vollkornnudeln und -reis
- Gemüse
- Früchte

Es ist daher sinnvoll, abwechslungsreiche Mahlzeiten mit Vollkornprodukten zu sich zu nehmen.



3. Ein gesunder Tagesablauf: Zusammensetzung ausgewogener Mahlzeiten

Frühstück

- Vollkornprodukt (z.B. Vollkornbrot)
- fetthaltiges Lebensmittel
- Milchprodukt: Naturjogurt, Scheibenkäse, Streichkäse oder ähnliche Produkte
- gegebenenfalls proteinhaltige Nahrungsmittel: gekochter Schinken, Pute, Hähnchen
- Früchte

Mittagessen

Warme Mahlzeit

- $\frac{1}{2}$ Teller Gemüse
- $\frac{1}{4}$ Teller Kohlenhydrate (vorzugsweise Vollkornprodukte)
- $\frac{1}{4}$ Teller mit proteinhaltigen Nahrungsmitteln: Fleisch oder Fisch

ANMERKUNG:
Die Vorschläge für
Mittag- und
Abendessen können
jeweils ausgetauscht
werden.

Abendessen

Kalte Mahlzeit

- $\frac{1}{2}$ Teller Gemüse
- $\frac{1}{4}$ Teller Kohlenhydrate (z. B. Brot, vorzugsweise Vollkornprodukte)
- $\frac{1}{4}$ Teller mit proteinhaltigen Nahrungsmitteln: Fleisch oder Fisch



4. Ratschläge für eine gesunde Ernährung

PRODUKTE	EMPFOHLEN ☺	VERMEIDEN ☹
GETRÄNKE 	<ul style="list-style-type: none"> Mineralwasser Sprudelwasser (außer bei Sodabrennen) Kaffee (In Maßen) Tee 	<ul style="list-style-type: none"> Softdrinks (Cola, Limonade, usw.) Fruchtsäfte Zuckerhaltiger Instantkaffee, wie z. B. Cappuccino
GETREIDE 	<ul style="list-style-type: none"> Kartoffeln Vollkornprodukte (Nudeln, Reis), Grieß, Weizen Vollkornbrot ballaststoffhaltige Getreideprodukte 	<ul style="list-style-type: none"> Instantpüree Baguette Cornflakes mit Zuckerzusatz Fertiggerichte Brioche, Croissants, Pains au Chocolat, usw.
MILCHPRODUKTE 	<ul style="list-style-type: none"> Käse Naturjogurt, Naturquark Fruchtjogurts mit weniger als 15 g Zucker pro 100 g Naturjogurts aus Sojamilch Sojamilch oder Sojasaft ohne Zuckerzusatz 	<ul style="list-style-type: none"> Fruchtjogurts mit mehr als 15 g Zucker pro 100 g Nachtische auf Milchbasis: Mousse au chocolat, Pudding, usw.
FRÜCHTE 	<ul style="list-style-type: none"> 2 bis 3 Früchte pro Tag am besten als Nachtisch oder zusammen mit einem Milchprodukt 	<ul style="list-style-type: none"> Saft oder Fruchtsaft Fruchtsirup Trockenfrüchte

5. Allgemeine praktische Informationen

Ernährung

Um ihre Blutzuckerwerte nicht unnötig zu erhöhen, sollten Sie besonders während der ersten Woche der Messungen:

- auf Lebensmittel, die einfache Kohlenhydrate enthalten, erkennbar am süßen Geschmack, verzichten (z.B. weißer Zucker, brauner Zucker, Honig und zuckerhaltige Lebensmittel). Damit vermeiden Sie erhöhte Blutzuckerwerte, die eine Therapie erforderlich machen würden.
- Essen Sie Früchte als Nachtisch und vermeiden Sie Fruchtsäfte.

Zusätzlich zu ihrer ersten Schulung in der Gruppe, können Sie einen individuellen Termin bei unserer Ernährungsberaterin vereinbaren. Sie wird Sie auf eventuelle Fehler in Ihrer Ernährung hinweisen und versuchen, die Ernährungsempfehlungen Ihrer Lebenssituation und ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen, insbesondere in Hinsicht auf die Auswahl der Lebensmittel.



NACH DER GEBURT

18

Am Tag vor der Geburt

19

Wenn Sie bei einer bevorstehenden Geburt oder einem geplanten Kaiserschnitt bereits medikamentös behandelt werden (Insulin, orale Medikamente), erhalten Sie individuelle Anweisungen von den Krankenschwestern oder Ihrem behandelnden Arzt.

Am Tag der Geburt

Das am Tag der Geburt im Kreißsaal anwesende Entbindungsteam ist über Ihren Schwangerschaftsdiabetes informiert und überwacht die Blutzuckerwerte während der Wehen.

Erhalten Sie eine Therapie mit Insulin oder anderen Medikamenten, folgen Sie den Anweisungen Ihres Arztes oder der Diabetesklinik (in der Regel wird die Therapie pausiert, in manchen Fällen wird ein Behandlungsschema für die Entbindung festgelegt).

Die Blutzuckerwerte Ihres Kindes werden ebenfalls zum Zeitpunkt der Geburt sowie jeweils 6, 12 und 24 Stunden nach der Geburt gemessen (wobei die Werte > oder = 45 mg/dl betragen müssen).

Nach der Geburt (postpartum)

Auch nach der Geburt müssen Sie noch zwei ganze Tage Ihre Blutzuckerwerte 6 Mal am Tag kontrollieren. Sie sollten auch weiterhin auf eine ausgewogene Ernährung achten, jedoch dürfen Sie wieder einige zuckerhaltige Lebensmittel, die Sie vor der Schwangerschaft gegessen haben, in Ihre Ernährung einbinden.

Die Blutzuckerwerte **nach** der Geburt

sollten wie folgt aussehen:

- nüchtern <100 mg/dl,
- 2 Stunden nach Beginn einer Mahlzeit < 140 mg/dl

Das Team der Clinique Bohler wird die Diabetesklinik über Ihre Entbindung informieren, die Sie dann 2 oder 3 Tage nach der Geburt Ihres Kindes in Ihrem Zimmer besucht. Bei den meisten Frauen normalisieren sich die Blutzuckerspiegel ohne Ernährungseinschränkung wieder. Sollte dies auch bei Ihnen der Fall sein, freuen wir uns, wenn Sie das Blutzuckermessgerät, das Sie während Ihrer Schwangerschaft erhalten haben, wieder an uns zurückgeben. Bleiben die Blutzuckerwerte erhöht, wird der diensthabende Arzt der Diabetesklinik über die möglicherweise notwendige Fortsetzung der Behandlung entscheiden.

Drei Monate nach der Geburt oder am Ende der Stillzeit sollten Sie eine Kontrolluntersuchung durchführen lassen. Anschließend sollten Sie sich einmal pro Jahr von Ihrem behandelnden Hausarzt auf Diabetes mellitus untersuchen lassen.

Eventuell wird das Ärzte- und Pflegeteam Ihnen noch individuelle Empfehlungen mit auf den Weg geben.

PERSÖNLICHE ANGABEN UND ANAMNESE

Ihre behandelnden Ärzte:

Frauenarzt: Facharzt für Diabetologie:
Hausarzt:

INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER SCHWANGERSCHAFT:

(Ihre Diabetesschwester wird die folgenden Fragen mit Ihnen ausfüllen)

Allgemeine Informationen:

Personenstand:
Beruf:
Beginn des Mutterschutzes:
Sprachen:

Gesundheitsbezogene Informationen:

Gewicht vor der Schwangerschaft: Größe: BMI:

Fälle von Diabetes in der Familie: Ja Nein

Wenn ja, bitte erläutern:
.....
.....

Zuckertoleranztest T0 T60' T120'

Informationen bezüglich der Schwangerschaft:

Anzahl der Schwangerschaften, einschliesslich der aktuellen:
Anzahl der vorausgegangenen Geburten:
Errechneter Geburtstermin:
Geplante Entbindungsmethode:

Risikoschwangerschaft?:

Alter (< 20 oder > 35) Zwillingsschwangerschaft Vorausgegangene Präeklampsie
 Andere Risiken:

20

21

Vorherige Schwangerschaft(en)?:

Anzahl an Kindern:

Geburtsjahr: Geburtsgewicht:

Geburtsjahr: Geburtsgewicht:

Geburtsjahr: Geburtsgewicht:

Geburtsjahr: Geburtsgewicht:

Vorherige Komplikationen:

.....

.....

Zusätzliche Angaben:

.....

.....

Vorherige Fälle von Schwangerschaftsdiabetes:

DT₁

DT₂

Behandlung HbA_{1c}

Bekannt seit:

TERMINE IN DER DIABETESKLINIK

Termine mit dem **FACHARZT FÜR DIABETOLOGIE**:

Datum					
Uhrzeit					

Termine mit dem **FACHPFLEGEPERSONAL FÜR DIABETOLOGIE**:

3. Etage in der Diabetesklinik im Hôpital Kirchberg, Raum 3302.3

Datum					
Uhrzeit					
Datum					
Uhrzeit					
Datum					
Uhrzeit					
Datum					
Uhrzeit					
Datum					
Uhrzeit					

22

23

UNTERSUCHUNGEN:

Blutwerte:	Datum				
Blutzucker					
HbA1c					
Harnstoff					
Kreatinin					
Cholesterin					
Triglyceride					
C-Peptid					

Urinuntersuchung:	Datum				
Glucose					
Leukozyten					
Ketonkörper					
Albumin					

Blutuntersuchungen NACH DER GEBURT :

Blutzucker		
HbA1c		
Harnstoff		
Kreatinin		
Cholesterin		

SELBSTKONTROLLE DER BLUTZUCKERWERTE, BEHANDLUNG UND ÜBERWACHUNG

	Datum	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Frühstück	Datum	/	/	/	/	/	/	/
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafens zeit	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Blutdruck								
Gewicht								
Anmerkungen								
Neue Behandlung								

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
24	Datum							
24	Uhrzeit							
25	Blutzuckerwert nüchtern <95							
25	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Frühstück	Datum							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafenszeit	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

26

27

	Datum	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Frühstück	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
Abendessen	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Schlafenszeit	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Blutdruck	Blutdruck							
	Gewicht							
Anmerkungen	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
28	Uhrzeit							
29	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Mittagessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Abendessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Schlafenszeit							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Frühstück	Datum							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
Mittagessen	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Basalinsulin							
Schlafenszeit		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Frühstück	Datum							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafenszeit	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	
	Datum								
32	Frühstück	Uhrzeit							
33		Blutzuckerwert nüchtern <95							
		Basalinsulin							
		Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
		Uhrzeit							
		Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Mittagessen	Uhrzeit							
		Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
		Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
		Uhrzeit							
		Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Abendessen	Uhrzeit							
		Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
		Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
		Uhrzeit							
		Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Schlafenszeit	Basalinsulin							
			Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
		Blutdruck							
		Gewicht							
		Anmerkungen							
		Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Frühstück	Datum							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafenszeit	Uhrzeit							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
Anmerkungen								
Neue Behandlung								

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Frühstück	Datum							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafenszeit	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

36

37

Schwangerschaftsdiabetes Informationsbroschüre

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
36	Uhrzeit							
37	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Frühstück							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Mittagessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Abendessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Schlafenszeit							
	Basalinsulin							

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Blutdruck							
Gewicht							
Anmerkungen							
Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
38	Datum							
38	Uhrzeit							
39	Frühstück	Blutzuckerwert nüchtern <95						
39	Basalinsulin							
39	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
39	Uhrzeit							
39	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
40	Mittagessen	Uhrzeit						
40	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
40	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
40	Uhrzeit							
40	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
41	Abendessen	Uhrzeit						
41	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
41	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
41	Uhrzeit							
41	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
42	Schlafenszeit	Basalinsulin						
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
	Uhrzeit							
Frühstück	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafenszeit	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
40	Uhrzeit							
41	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Mittagessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Abendessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Schlafens Zeit							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Datum							
Uhrzeit							
Blutzuckerwert nüchtern <95							
Basalinsulin							
Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Uhrzeit							
Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Mittagessen							
Uhrzeit							
Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Uhrzeit							
Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen							
Uhrzeit							
Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Uhrzeit							
Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafens							
zeit							
Basalinsulin							
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Blutdruck							
Gewicht							
Anmerkungen							
Neue Behandlung							

42

43

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
42	Uhrzeit							
43	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Mittagessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Abendessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Schlafens Zeit							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
	Uhrzeit							
Frühstück	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafenszeit	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
44	Uhrzeit							
45	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Mittagessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Abendessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Schlafens Zeit							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
	Uhrzeit							
Frühstück	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafenszeit	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
46	Uhrzeit							
47	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Mittagessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Abendessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Schlafens Zeit							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
	Uhrzeit							
Frühstück	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafens zeit	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

48

49

Schwangerschaftsdiabetes Informationsbroschüre

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Mittagessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Abendessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Schlafens Zeit							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Frühstück	Datum							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
Mittagessen	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
Abendessen	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
Schlafens zeit	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Blutdruck								
Gewicht								
Anmerkungen								
Neue Behandlung								

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Mittagessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Abendessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Schlafens Zeit							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
	Uhrzeit							
Frühstück	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafens zeit	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
52	Uhrzeit							
53	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Mittagessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Abendessen							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
	Schlafenszeit							
	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							

		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Datum							
	Uhrzeit							
Frühstück	Blutzuckerwert nüchtern <95							
	Basalinsulin							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Mittagessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Abendessen	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert vor der Mahlzeit							
	Schnelles Insulin oder orale Antidiabetika							
	Uhrzeit							
	Blutzuckerwert nach 2 St. <120							
Schlafens zeit	Basalinsulin							
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Blutdruck							
	Gewicht							
	Anmerkungen							
	Neue Behandlung							





Hôpital Kirchberg
9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
T +352 286 911



ÄRZTETEAM

Hôpital Kirchberg

Dr Andreas BENDER- Praxis 5, Erdgeschoss - **T +352 2862 4223**
E-mail: sekretariat.dr.bender@gmail.com

Dr Anja BRAUN - Praxis 2, Erdgeschoss - **T +352 2862 4260**
E-mail: vero.ferreira@hopitauxschuman.lu

Dr Danièle de la HAMETTE - Praxis 10, Erdgeschoss - **T +352 2862 4020**
E-mail: secretariat@drdelahamette.lu

Dr Alina DUMITRESCU- Praxis 10, Erdgeschoss **T : +352 2862 4380**
E-mail: endo.alina.dumitrescu@gmail.com

Dr Flavia CURRELI - **T +352 2862 0132**
E-mail : info@dr-curreli.lu, 59, rue de Wormeldange L-6180 Gonderange (Luxembourg)

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Patricia MARX, Cynthia SCHWEICH et Claire HUBERTY- **T (+352) 2862-3502/3505/3506**

PFLEGEPERSONAL

Isabelle DELAISSE, Maria DHUR, Audrey GUTTINGER, Isabel SANTOS

ÖFFNUNGSTAGS UND ÖFFNUNGSZEITEN

Montag & Freitag **8-20 Uhr**
Dienstag, Mittwoch & Donnerstag **8-16.30 Uhr**
T +352 2862 6325
F +352 2862 6300
E-mail: diabete@hopitauxschuman.lu

Geben sie ihre Sozialsversicherungsnummer an

LOCALISATION

Hôpital Kirchberg
3. Etage | Raum 3302

W.05.2021 Ed.07.2024

www.hopitauxschuman.lu

Réf. Nr. article Orbis: 1021266

Description: GUIDE DU DIABÈTE GESTATIONNEL DE