

Hôpitaux Robert Schuman

9, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

T +352 286 911

www.facebook.com/hopitauxrobertschuman

www.hopitauxschuman.lu

SITES UTILES

www.acteurdemasante.lu



INFORMATION RELATIVE À LA PRÉVENTION DES INFECTIONS RESPIRATOIRES À VRS PAR ABRYSSVO®



PRÉVENTION INFECTIONS

VRS

Ref. Nr. Article Orbis: 1028860

Description : Flyer RSV - ABRYSSVO (FR)

Imprimé au Luxembourg

W. 10 2024 - Ed. 10 2024

hopitauxschuman.lu

facebook.com/hopitauxrobertschuman

QU'EST-CE QU'UNE INFECTION À VRS ?

Le virus respiratoire syncytial (VRS) peut provoquer des symptômes comparables à ceux d'un rhume mais également entraîner des bronchiolites. La bronchiolite est très contagieuse et touche généralement les enfants de moins de 2 ans. La période d'épidémie de bronchiolite débute en automne et se termine à la fin de l'hiver. Même si généralement la maladie n'est pas grave, elle peut dans certains cas entraîner une hospitalisation, voire une admission en réanimation.

QU'EST-CE QUE LE ABRYSVO® ? À QUI EST-IL DESTINÉ ?

Abrysvo® est un vaccin destiné à protéger contre les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les adultes âgés de 60 ans et plus.

Il est également destiné à être utilisé chez les femmes enceintes (entre la 24e et la 36e semaine d'aménorrhée) afin de protéger leurs nourrissons contre le VRS de la naissance jusqu'à l'âge de six mois.

Le vaccin contient les antigènes F du VRS des sous-groupes A et B stabilisés en forme préfusion.

COMMENT EST-IL ADMINISTRÉ ?

Votre médecin injectera la dose à administrer (0,5 mL) dans le muscle du bras. L'injection peut être administrée en même temps que le vaccin quadrivalent contre la grippe saisonnière. L'injection sera notée dans votre carnet de vaccination.

AVANT D'ADMINISTRER ABRYSVO®

Il est important d'informer votre médecin si :

- vous avez une allergie à l'un des composants du médicament
- vous avez des problèmes de saignement ou un faible nombre de plaquettes sanguines
- vous avez tendance à avoir des hématomes ou vous êtes traité par un médicament anticoagulant (pour fluidifier le sang et prévenir la formation de caillots)

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POTENTIELS ?

Comme tout médicament, le Abrysvo® peut parfois entraîner des effets indésirables. Ils apparaissent généralement dans les jours suivants l'injection et sont de faible intensité et de courte durée.

Les effets indésirables possibles sont :

- une réaction au niveau de l'endroit où l'injection a été réalisée (rougeur, gonflement, douleur)
- des céphalées
- des myalgies

UNE RÉACTION ALLERGIQUE PEUT SURVENIR COMME POUR TOUT MÉDICAMENT INJECTABLE. LES SYMPTÔMES PRINCIPAUX SONT :

- des difficultés à respirer ou à avaler
- un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge
- des démangeaisons sévères au niveau de la peau pouvant être accompagnées de rougeurs et/ou de petites bosses

Si vous observez l'un de ces signes après l'injection, informez immédiatement votre médecin ou appelez le 112.

