

Hôpitaux Robert Schuman

9, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

T +352 286 911

www.facebook.com/hopitauxrobertschuman

www.hopitauxschuman.lu

SÍTIOS ÚTEIS

www.acteurdemasante.lu



HÔPITAUX
ROBERT
SCHUMAN



INFORMAÇÕES SOBRE A PREVENÇÃO DE INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS POR VSR COM ABRYSVO®



PREVENÇÃO DE INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS

Ref. Nr. Article Orbis: 1028863

Descrição : Flyer RSV - ABRYSVO (PT)

Impresso no Luxemburgo

W. 10 2024 - Ed. 10 2024

hopitauxschuman.lu



facebook.com/hopitauxrobertschuman

O QUE É UMA INFEÇÃO POR VSR?

O vírus sincicial respiratório (VSR) pode causar sintomas semelhantes aos de uma constipação, mas também pode provocar bronquiolite. A bronquiolite é altamente contagiosa e geralmente afeta crianças com idade inferior a dois anos de idade. O período epidêmico da bronquiolite começa no outono e termina no fim do inverno. Embora a doença não seja geralmente grave, em alguns casos pode levar à hospitalização ou mesmo ao internamento nos cuidados intensivos.

O QUE É O ABRYSVO® E A QUEM SE DESTINA?

Abrysvo® é uma vacina concebida para proteger contra a doença do trato respiratório inferior causada pelo VSR em adultos com idade igual ou superior a 60 anos.

Também se destina a ser utilizada em mulheres grávidas (entre 24 e 36 semanas de amenorrea) para proteger os seus bebés contra o VSR desde o nascimento até aos seis meses de idade.

A vacina contém antigénios F do VSR dos subgrupos A e B estabilizados sob a forma de pré-fusão.

COMO É ADMINISTRADO?

O seu médico injetará a dose a administrar (0,5 mL) no músculo do seu braço. A injeção pode ser administrada ao mesmo tempo que a vacina quadrivalente contra a gripe sazonal. A injeção será registada no seu boletim de vacinas.

ANTES DE ADMINISTRAR ABRYSVO®, É IMPORTANTE INFORMAR O SEU MÉDICO SE:

- é alérgico a qualquer um dos ingredientes deste medicamento
- tem problemas de hemorragia ou um número baixo de plaquetas no sangue
- tem tendência para hematomas ou está a ser tratado com medicamentos anticoagulantes (para diluir o sangue e evitar a formação de coágulos)

QUAIS SÃO OS POTENCIAIS EFEITOS ADVERSOS?

Como todos os medicamentos, Abrysvo® pode por vezes causar efeitos indesejáveis. Estes surgem geralmente nos dias que se seguem à injeção e são de fraca intensidade e curta duração.

Os efeitos secundários possíveis são :

- uma reação no local da injeção (vermelhidão, inchaço, dor)
- dores de cabeça
- mialgia

COMO ACONTECE COM QUALQUER MEDICAMENTO INJETÁVEL, PODE OCORRER UMA REAÇÃO ALÉRGICA. OS PRINCIPAIS SINTOMAS SÃO:

- dificuldade em respirar ou engolir
- inchaço da face, lábios, língua ou garganta
- comichão intensa na pele, que pode ser acompanhada de vermelhidão e/ou pequenos inchaços

Se notar algum destes sinais após a injeção, informe imediatamente o seu médico ou ligue para o 112.

